

1. Пацієнту неврологічного відділення з припущенням на субарахноїдальний крововилив проведено спинномозкову пункцію. Який колір ліквору характерний для цього виду порушення мозкового кровообігу?

- А. Червоний
- В. Безбарвний
- С. Каламутний
- Д. Жовтувато-зеленуватий
- Е. Прозорий

2. Чоловік, який хворіє на гіпертонічну хворобу, після емоційного перенавантаження раптово втратив свідомість. Об'єктивно спостерігається: зіниці на світло не реагують, гіперемія обличчя, пульс — 110 уд./хв, напружений, АТ — 200/110 мм рт. ст., лівий кут рота опущений, лівостороння геміплегія. Яке положення тіла треба надати пацієнту під час надання невідкладної допомоги?

- А. На спині, з піднятим головним кінцем ліжка
- В. На спині, з піднятим ножним кінцем ліжка
- С. На животі, з повернутою набік головою
- Д. На правому боці, з відхиленою назад головою
- Е. На лівому боці, з відхиленою назад головою

3. Під час лабораторного дослідження мокротиння виявлено спіралі Куршмана, кристали Шарко-Лейдена та еозинофіли. Для якого захворювання характерний цей результат дослідження?

- А. Бронхіальної астми
- В. Гострого бронхіту
- С. Бронхоектатичної хвороби
- Д. Туберкульозу легень
- Е. Сухого плевриту

4. У чоловіка з діагнозом: недостатність мітрального клапана, після фізичного навантаження раптово з'явилися задишка, клокотливе дихання, виділення рожевого пінистого мокротиння. Який патологічний стан розвинувся у чоловіка?

- А. набряк легень
- В. Легенева кровотеча
- С. Гіпертонічний криз
- Д. Астматичний статус
- Е. Серцева астма

5. Чоловік віком 50 років скаржиться на загальну слабкість, свербіж шкіри, тупий ниючий біль у правому підребер'ї, здуття живота, закрепи, що чергуються

з діареєю. Об'єктивно спостерігається: збільшення печінки, судинні зірочки на шкірі, розширення венозної сітки навколо пупка, асцит, гінекомастія. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- А. Цирозу печінки
- В. Хронічного гепатиту
- С. Вірусного гепатиту
- Д. Хронічного холециститу
- Е. Жовчнокам'яної хвороби

6. Який розчин використовується для промивання постійного катетера Фолля?

- А. 0,02%-й розчин фурациліну
- В. 5%-й розчин глюкози
- С. 2%-й розчин натрію гідрокарбонату
- Д. 3%-й розчин хлораміну
- Е. 6%-й розчин перекису водню

7. Як називається процедура, що полягає у введенні розчинів лікарських засобів через порожнину матки в маткові труби для визначення їх прохідності або з лікувальною метою?

- А. Гідротубація
- В. Пертубація
- С. Лапароскопія
- Д. Кольпоскопія
- Е. Гістероскопія

8. Щеплення новонароджених дітей від туберкульозу проводиться введенням вакцини БЦЖ внутрішньошкірно. Яке ускладнення розвивається у разі випадкового потрапляння вакцини під шкіру?

- А. «Холодний абсцес»
- В. Ліподистрофія
- С. Медикаментозна емболія
- Д. Виразка
- Е. Інфільтрат

9. Вкажіть віддалене ускладнення генітального туберкульозу в жінок.

- А. Безпліддя
- В. Субфебрилітет
- С. Порушення менструального циклу
- Д. Швидка втомлюваність
- Е. Підвищена пітливість

10. Для профілактики якого ускладнення під час підшкірної ін'єкції олійного розчину потрібно відтягнути поршень шприца назад після проколу шкіри перед введенням препарату?

- A.** Медикаментозної емболії
- B.** Інфільтрату
- C.** Гематоми
- D.** Повітряної емболії
- E.** Некрозу

**11.** Пацієнт, який збирає сечу для дослідження за методом Зимницького, повідомив сестру медичну про те, що не може зібрати сечу в третій контейнер, у зв'язку з відсутністю позиву до сечовипускання. Яка тактика сестри медичної в цьому разі?

- A.** Залишити третій контейнер порожнім
- B.** Дати пацієнту випити води
- C.** Увести пацієнту сечогінний препарат
- D.** Застосувати методи рефлекторного впливу на акт сечовипускання
- E.** Виконати катетеризацію сечового міхура

**12.** Для якого захворювання характерні такі особливості аналізу сечі: сеча каламутна, з осадом і пластівцями, лейкоцитурія, бактеріурія, протеїнурія (менше 1 г/л)?

- A.** Гострого пієлонефриту
- B.** Гострого гломерулонефриту
- C.** Хронічного гломерулонефриту
- D.** Сечокам'яної хвороби
- E.** Гострої ниркової недостатності

**13.** Яке положення тіла потрібно надати шестирічній дитині, у якої після введення антибіотика розвинувся анафілактичний шок?

- A.** На спині, з повернутою на бік головою
- B.** На животі
- C.** Напівсидяче
- D.** На лівому боці
- E.** На спині, з припіднятими ногами

**14.** Жінка віком 28 років скаржиться на загальну слабкість і гострий біль у грудній клітці справа, що посилюється під час глибокого вдиху та нахилі тулуба в протилежний бік. Об'єктивно спостерігається: пацієнтка лежить на правому боці, дихання часте, поверхневе, температура тіла — 37,4°C, права половина грудної клітки відстає в акті дихання, перкуторно над легеньми визначається чіткий легеневий звук, аускультативно вислуховується шум тертя плеври. Для якого захворювання характерні ці клінічні прояви?

- A.** Сухого плевриту
- B.** Міжреберної невралгії
- C.** Гострого бронхіту
- D.** Ексудативного плевриту
- E.** Негоспітальної пневмонії

**15.** Пацієнту встановлено діагноз: інсулінозалежний цукровий діабет. Яка тактика зменшить ризик розвитку атрофії підшкірної жирової клітковини під час інсулінотерапії?

- A.** Зміна місця ін'єкцій
- B.** Використання інсулінових шприців
- C.** Уведення підігрітого розчину інсуліну
- D.** Повільне (упродовж 15–20 хв) введення інсуліну
- E.** Уведення інсуліну за 15–20 хв до приймання їжі

**16.** Як називається метод неінвазивного дослідження функції зовнішнього дихання, що проводиться для оцінки стану легень та бронхів, діагностики захворювань дихальної системи та контролю їх лікування?

- A.** Спірографія
- B.** Бронхоскопія
- C.** Оглядова рентгенографія органів грудної клітки
- D.** УЗД легенів
- E.** Шкірні алергологічні тести

**17.** Пацієнт ендокринологічного відділення скаржиться на прискорене серцебиття, біль у ділянці серця, погіршення сну, схуднення на тлі підвищення апетиту. Об'єктивно спостерігається: пацієнт збуджений, тремор пальців рук, шкіра волога, тепла, температура тіла — 37,2°C, пульс — 100 уд./хв, АТ — 150/90 мм рт. ст., екзофтальм, позитивний симптом Грефе, збільшення щитоподібної залози, тони серця звучні, систолічний шум на верхівці. Яке дослідження треба провести для визначення функції щитоподібної залози?

- A.** Аналіз крові на тиреоїдні гормони
- B.** УЗД щитоподібної залози
- C.** Аналіз крові на глюкозу
- D.** Загальний аналіз крові
- E.** МРТ головного мозку

**18.** У чоловіка віком 50 років раптово виник різкий, інтенсивний, стискальний, пекучий біль за грудниною з іррадіацією в ліву руку та ліву лопатку. Біль триває упродовж 2-х годин, не знімається нітроглицерином. Об'єктивно спостерігається: пацієнт збуджений, відчуває страх смерті, шкіра та видимі слизові оболонки бліді, ціаноз губ, пульс — 84 уд./хв,

ритмічний, АТ — 130/80 мм рт. ст., тони серця ослаблені. На ЕКГ спостерігається патологічний зубець Q у відведеннях I, aVL і V1-V2. Для якого клінічного варіанта інфаркту міокарда це характерно?

- А. Ангінозного
- В. Астматичного
- С. Гастралгічного
- Д. Аритмічного
- Е. Церебрального

19. Пацієнту призначено внутрішньом'язове введення 60 мг 4%-го розчину гентаміцину сульфату. В ампулах по 2 мл міститься 80 мг цього антибіотика. Який об'єм препарату треба набрати у шприц для виконання ін'єкції?

- А. 1,5 мл
- В. 1 мл
- С. 2 мл
- Д. 0,5 мл
- Е. 3 мл

20. Для профілактики якого специфічного ускладнення черевного тифу на 3-му тижні хвороби пацієнту треба дотримуватися ліжкового режиму?

- А. Кишкової кровотечі
- В. Генералізації інфекції
- С. Рецидиву захворювання
- Д. Розриву селезінки
- Е. Печінкової недостатності

21. У дівчини віком 19 років на шкірі грудної клітки, шиї, бічних поверхонь тулуба, міжлопаткової ділянки та плечей виявлено численні незапальні плями жовтувато-коричневого та блідо-рожевого кольору. Позитивні «симптом стружки» (лущення плям у разі пошкрябування) та йодна проба Бальцера. Для якого захворювання характерні ці клінічні прояви?

- А. Висівкоподібного лишая
- В. Дерматиту
- С. Екземи
- Д. Токсикодермії
- Е. Мікроспорії

22. У чоловіка віком 28 років у ділянці верхньої губи спостерігаються гіперемія шкіри та поява дрібних пухирців із гнійним умістом, покритих жовтими кірками, піднижньощелепний лімфаденіт. Для якої патології характерні ці симптоми?

- А. Сикозу
- В. Кандидозу
- С. Мікроспорії
- Д. Імпетиго
- Е. Фурункулу

23. Пацієнту віком 58 років діагностовано цироз печінки. Раптово у нього з'явилися такі симптоми: збудження змінилося на сонливість, нудота, блювання, посьмикування м'язів обличчя та кінцівок, з рота відчувається запах аміаку, температура тіла — 40,0°C, дихання Чейна-Стокса. Яке ускладнення розвинулося у пацієнта?

- А. Печінкова кома
- В. Шлункова кровотеча
- С. Пенетрація
- Д. Бактеріальний перитоніт
- Е. Перфорація

24. Який метод контролю якості дезінфекції передбачає посів матеріалу на поживне середовище для виявлення мікрофлори?

- А. Бактеріологічний
- В. Хімічний
- С. Фізичний
- Д. Візуальний
- Е. Інструментальний

25. Жінку в терміні вагітності 38–39 тижнів шпиталізовано до пологового будинку. Вкажіть ознаку початку пологової діяльності у жінки.

- А. Регулярні перейми
- В. Часте сечовипускання
- С. Розкриття шийки матки
- Д. Опущення дна матки
- Е. Біль у ділянці крижів

26. Який збудник найчастіше спричиняє розвиток післяпологового маститу?

- А. Золотистий стафілокок
- В. Епідермальний стафілокок
- С. Анаеробні коки
- Д. Протей
- Е. Стрептокок

27. Як називається розмір площини входу в малий таз, що проходить між крижовим мисом та серединою верхньо-внутрішнього краю лобкового симфізу?

- А. Прямий
- В. Поперечний
- С. Інтерспінальний
- Д. Косий
- Е. —

28. У чоловіка виявлено відкритий пе-

релом середньої третини лівого стегна. Із рани пульсуючим струменем витікає кров яскраво-червоного кольору. Який тимчасовий метод спинення кровотечі потрібно застосувати в цьому разі?

- A.** Накладання артеріального джгута
- B.** Туга тампонада рани
- C.** Максимальне згинання кінцівки в суглобі
- D.** Тиснуча пов'язка
- E.** Підвищене положення кінцівки

**29.** Чоловік скаржиться на періодичні закрепи, випорожнення з домішками крові та переймоподібний біль у животі. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, живіт бере участь в акті дихання, м'який. У лівому підребер'ї пальпується щільне болюче утворення. Який інструментальний діагностичний метод використовується для обстеження всіх відділів товстого кишківника та взяття біопсії?

- A.** Колоноскопія
- B.** Оглядова рентгенографія ОЧП
- C.** Іригоскопія
- D.** Ультразвукове дослідження
- E.** Комп'ютерна томографія

**30.** У пацієнта, який хворіє на виразкову хворобу шлунку, раптово виникла шлунково-кишкова кровотеча. Які гемодинамічні зміни спостерігатимуться в пацієнта?

- A.** Тахікардія, зниження АТ
- B.** Брадикардія, підвищення АТ
- C.** Брадикардія, зниження АТ
- D.** Тахікардія, підвищення АТ
- E.** Аритмія, АТ не змінюється

**31.** Пацієнту діагностовано хронічну серцеву недостатність. Об'єктивно спостерігається: збільшення маси тіла та зменшення виділення кількості сечі. Аналіз водного балансу встановив, що добовий діурез пацієнта становить 50% від кількості прийнятої рідини. На що вказують результати обстеження?

- A.** Появу прихованих набряків
- B.** Зневоднення
- C.** Порушення метаболізму
- D.** Ожиріння
- E.** Ексикоз

**32.** Як називається спеціалізований медичний заклад стаціонарного типу, де проводиться паліативне лікування пацієнтів із невиліковними хворобами?

- A.** Хоспіс
- B.** Клініка
- C.** Санаторій
- D.** Амбулаторія
- E.** Поліклініка

**33.** Яке специфічне ускладнення інсулінотерапії може розвинутися, якщо не змінювати місце введення інсуліну?

- A.** Ліподистрофія
- B.** Абсцес
- C.** Гематома
- D.** Інфільтрат
- E.** Некроз

**34.** Яке додаткове обстеження потрібно провести пацієнту з припущенням на ішемічний інсульт?

- A.** Магнітно-резонансну томографію
- B.** Рентгенографію кісток черепа
- C.** Ехокардіографію
- D.** Електрокардіографію
- E.** Електроміографію

**35.** Який вид анестезії використовується під час оперативного лікування підшкірного панарицію?

- A.** За Оберстом-Лукашевичем
- B.** За Вишневським
- C.** Термінальна
- D.** Інфільтраційна
- E.** Внутрішньокісткова

**36.** Вкажіть метод специфічної профілактики туберкульозу, що проводиться особам, які перебувають у контакті з пацієнтом, хворим на активну форму туберкульозу.

- A.** Хіміопрофілактика ізоніазидом
- B.** Хіміопрофілактика стрептоміцином
- C.** Щеплення вакциною БЦЖ
- D.** Ревакцинація вакциною БЦЖ
- E.** —

**37.** Жінка отримала опік окропом передньої поверхні обох ніг, задньої поверхні тулуба та промежини. Визначте площу опікового ураження.

- A.** 37%
- B.** 25%
- C.** 39%
- D.** 51%
- E.** 19%

**38.** Які продукти треба обмежити в раціоні пацієнта, у якого виявлено здуття живота та метеоризм?

- A. Капусту, бобові
- B. М'ясо, печінку
- C. Каву, міцний чай
- D. Яйця, гречану крупу
- E. Яблука, гарбуз

39. У пацієнта розвинувся анафілактичний шок. Який лікарський препарат використовується насамперед під час надання невідкладної допомоги пацієнту?

- A. Епінефрин
- B. Ампіцилін
- C. Атропін
- D. Еритроміцин
- E. Диклофенак

40. У жінки в терміні вагітності 35 тижнів з'явилися різкий біль у животі та незначні кров'янисті виділення зі статевих шляхів. Об'єктивно спостерігається: блідість шкіри, пульс — 100 уд./хв, АТ — 100/60 мм рт. ст., матка напружена, болюча, положення плода поздовжнє, голівка передлежить над площиною входу в малий таз, ЧСС плода — 160 уд./хв, ритмічне. Який патологічний стан розвинувся у жінки?

- A. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти
- B. Аборт у ході
- C. Розрив матки, що відбувся
- D. Загроза розриву матки
- E. Неповне передлежання плаценти

41. Чоловік після тряскої їзди скаржиться на сильний нападopodobний біль у поперековій ділянці та часті позиви до сечовипускання, нудоту, блювання. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, пацієнт збуджений, намагається обрати положення тіла для полегшення болю. Які заходи долікарської допомоги доцільно застосувати в цьому разі?

- A. Покласти грілку на поперекову ділянку
- B. Покласти міхур із льодом на поперекову ділянку
- C. Увести сечогінні препарати
- D. Провести катетеризацію сечового міхура
- E. Увести седативні препарати

42. У тримісячної дитини спостерігається неспокій, плаксивість, порушення сну, підвищена пітливість, облісіння потилиці, здуття живота. Для якого захворювання характерні ці клінічні прояви?

- A. Рахіту
- B. Спазмофілії
- C. Гіпервітамінозу D
- D. Алергічного діатезу
- E. Гіпотрофії

43. Жінка віком 20 років скаржиться на загальну слабкість, підвищену втомлюваність, прискорене серцебиття, порушення смаку (бажання їсти крейду), блідість та сухість шкіри, ламкість нігтів, випадіння волосся. Для якого виду анемії характерні ці симптоми?

- A. Залізодефіцитної
- B. Фолієводефіцитної
- C. Гемолітичної
- D. Вітамін B<sub>12</sub>-дефіцитної
- E. Гіпопластичної

44. Із якою метою флакон із вушними краплями перед застосуванням треба підігріти у руках до температури тіла людини?

- A. Для уникнення запаморочення
- B. Для попередження підвищення температури тіла
- C. Для підсилення лікувального ефекту
- D. Для кращої взаємодії з назальними краплями
- E. Для попередження виникнення кашлю

45. Вкажіть дію, спричинену електричним струмом, що проходить через організм людини, яка виявляється у подразненні збудливих тканин організму людини.

- A. Біологічну
- B. Магнітну
- C. Термічну
- D. Електролітичну
- E. —

46. Жінка віком 57 років скаржиться на біль у дрібних суглобах кистей рук, ранкову скутість, загальну слабкість. Об'єктивно спостерігається: температура тіла — 37,5°C, набряк і почервоління п'ястково-фалангових і міжфалангових суглобів обох кистей та обмеження їхньої рухомості, кисти мають вигляд «ластів моржа». Визначення рівня якого лабораторного показника є найінформативнішим для встановлення діагнозу?

- A. Ревматоїдного фактора
- B. АлАТ, АсАТ
- C. С-реактивного білка
- D. Білірубину та його фракцій
- E. Сечової кислоти

47. Опіки якого ступеня характеризуються появою пухирів різної величини, на-

повнених прозорою рідиною, на тлі гіперемованої шкіри?

- A. II
- B. I
- C. III
- D. IV
- E. —

48. Працівники, які обслуговують каналізаційну мережу, відчули в повітрі специфічний запах «тухлих яєць». За одну годину після цього в них з'явилися сльозотеча, різі в очах, кашель, нежить, задишка, біль у грудях, головний біль, запаморочення, нудота. Для отруєння якою хімічною речовиною характерні ці симптоми?

- A. Сірководнем
- B. Аміаком
- C. Хлором
- D. Фосгеном
- E. Вуглецю оксидом

49. Пацієнтка віком 60 років скаржиться на загальну слабкість, задишку, серцебиття, пощипування язика, зниження апетиту, утруднення при ходінні, відчуття оніміння в кінцівках. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда з лимонним відтінком, язик гладкий, глянцево-жовтий, з атрофією сосочків. Живіт під час пальпації м'який, не болючий, печінка виступає з-під краю реберної дуги на 1,5 см. У загальному аналізі крові: еритроцити —  $1,2 \cdot 10^{12}/л$ , гемоглобін — 58 г/л, КП — 1,4, виявлено тільця Жоллі та кільця Кебота, макроцитоз. Для якого виду анемії характерні вказані клініко-лабораторні показники?

- A. Вітамін  $B_{12}$ -дефіцитної
- B. Гострої постгеморагічної
- C. Апластичної
- D. Залізодефіцитної
- E. Аутоімунної гемолітичної

50. У роділлі триває перший період фізіологічних пологів, латентна фаза. Термін вагітності — 39 тижнів, вагітність II, пологи II. Як часто потрібно вислуховувати серцебиття для оцінки стану плода?

- A. Кожні 30 хв
- B. З інтервалом 10 хв
- C. Раз на 1 год
- D. Кожні 15 хв
- E. З інтервалом 20 хв

51. Що з нижченаведеного відноситься до медичних відходів категорії B?

- A. Використаний одноразовий шприц
- B. Дезінфекційні засоби
- C. Первинна упаковка лікарських засобів
- D. Побутові відходи усіх відділень закладу охорони здоров'я
- E. Харчові відходи усіх відділень закладу охорони здоров'я

52. Який із нижченаведених методів дослідження є найінформативнішим у діагностиці бронхоектатичної хвороби?

- A. Бронхографія
- B. Ларингоскопія
- C. Спірометрія
- D. Бронхіальна артеріографія
- E. Велоергометрія

53. Який шлях передачі інфекції в закладах охорони здоров'я відноситься до артифіційних?

- A. Асоційований із медичними процедурами
- B. Фекально-оральний
- C. Контактно-побутовий
- D. Повітряно-краплинний
- E. Вертикальний

54. Які лікарські засоби відносяться до списку «B»?

- A. Сильнодіючі
- B. Отруйні
- C. Наркотичні
- D. Психотропні
- E. Імунобіологічні

55. Як називається індивідуальна упаковка, що безпосередньо контактує з лікарським засобом та сприяє збереженню його основних властивостей?

- A. Первинна
- B. Вторинна
- C. Загальна
- D. Спеціальна
- E. Зовнішня

56. У семирічній дитині після внутрішньовенного введення антибіотика з'явилися слабкість, пульсуючий головний біль, відчуття стиснення в грудях та нестачі повітря, надсадний кашель. Об'єктивно спостерігається: різка блідість шкірних покривів, експіраторна задишка, дистанційні хрипи. Для якого варіанта перебігу анафілактичного шоку характерні зазначені симптоми?

- A. Асфіктичного
- B. Гемодинамічного
- C. Церебрального
- D. Абдомінального
- E. Змішаного

57. Пацієнт віком 52 роки скаржиться на нападоподібний біль у правому підребер'ї з іррадіацією в праве плече та праву ключицю, гіркоту в роті, нудоту. Виникнення цих симптомів пов'язує із вживанням смаженої їжі. Об'єктивно спостерігається: пацієнт неспокійний, язик обкладений жовтим нальотом, пульс — 88 уд./хв, ритмічний, АТ — 120/80 мм рт.ст. Живіт під час пальпації м'який, болючий у правому підребер'ї, позитивні симптоми Ортнера, Кера. Препарати якої групи потрібно застосувати насамперед для надання невідкладної допомоги?

- A. Спазмолітики
- B. Стимулятори перистальтики
- C. Ентеросорбенти
- D. Проносні
- E. Протимікробні

58. У пацієнта терапевтичного відділення діагностовано виразкову хворобу дванадцятипалої кишки. Яка бактерія спричиняє це захворювання?

- A. *Helicobacter pylori*
- B. *Staphylococcus aureus*
- C. *Streptococcus*
- D. *Salmonella*
- E. *Escherichia coli*

59. Який розмір периферичного венозного катетера переважно використовується для внутрішньовенних інфузій у новонароджених дітей?

- A. 26G
- B. 14G
- C. 16G
- D. 18G
- E. 20G

60. Вкажіть постін'єкційне ускладнення, що характеризується гнійним запаленням м'яких тканин та утворенням порожнини, заповненої гноем.

- A. Абсцес
- B. Інфільтрат
- C. Емболія
- D. Некроз
- E. Флебіт

61. Яке співвідношення розчинника та активної речовини антибіотика використовується у разі стандартного розведення антибіотика?

- A. 1 мл на 100 000 ОД
- B. 2 мл на 200 000 ОД
- C. 5 мл на 100 000 ОД
- D. 2 мл на 100 000 ОД
- E. 1 мл на 500 000 ОД

62. Пацієнту призначено фізіотерапевтичну процедуру, під час якої (внаслідок змінення проникності судинної стінки) у шкірі виникають точкові мікрокрововиливи (петехії, плями), до складу яких входять біологічно активні речовини, що надають потужний стимулюючий ефект як на весь організм, так і на певну зону до повного їх розсмоктування. Яку процедуру призначено пацієнту?

- A. Вакуум-терапію медичними банками
- B. Накладання гірчичників
- C. Застосування медичної грілки
- D. Накладання зігрівального компресу
- E. УВЧ-терапію

63. Який найпростіший фізіотерапевтичний засіб місцевого впливу застосовується у II періоді гарячки?

- A. Міхур із льодом
- B. Медичні банки
- C. Гірчичники
- D. Медичну грілку
- E. Зігрівальний компрес

64. У пацієнта, який хворіє на виразкову хворобу шлунку, раптово розпочалося блювання «кавовою гущею». Які заходи невідкладної допомоги треба провести насамперед на догоспітальному етапі?

- A. Прикласти міхур із льодом на ділянку епігастрія
- B. Промити шлунок
- C. Застосувати ентеросорбенти
- D. Прикласти медичну грілку на ділянку епігастрія
- E. Застосувати протиблювотні препарати

65. Пацієнт хворіє на хронічний спастичний коліт. Який найпростіший фізіотерапевтичний засіб місцевого впливу застосовується для зменшення болю у животі під час кишкової коліки?

- A. Медична грілка
- B. Медичні банки
- C. Гірчичники
- D. Міхур із льодом
- E. Медичні п'явки

66. Пацієнту, який хворіє на залізодефіцитну анемію, призначено терапію препаратами заліза. Одночасне приймання якого вітаміну покращує всмоктування та засвоєння заліза?

- A.** Аскорбінової кислоти
- B.** Ціанокобаламіну
- C.** Піридоксину
- D.** Кальциферолу
- E.** Токоферолу

**67.** У пацієтки перебіг цукрового діабету ускладнився розвитком синдрому діабетичної стопи. Які поради по догляду за нижніми кінцівками необхідно надати пацієнтці?

- A.** Не ходити босоніж
- B.** Користуватися пемзою
- C.** Носити відкрите взуття
- D.** Використовувати тальк
- E.** Приймати гарячі ванни для ніг

**68.** У п'ятирічної дитини, яка відвідує дитячий дошкільний заклад, спостерігається підвищення температури тіла, біль у горлі. Під час огляду виявлено блідість носогубного трикутника, «малиновий язик» та дрібнопапульозний висип на гіперемованій шкірі, що максимально локалізується на згинальних поверхнях кінцівок, у складках. Вкажіть термін ізоляції хворої дитини.

- A.** 22 дні
- B.** 21 день
- C.** 5 днів від моменту появи висипань
- D.** 5 днів від початку захворювання
- E.** 7 днів

**69.** Для якого захворювання характерні такі клінічні прояви: гострий початок, слабо виражені катаральні явища, дрібний блідо-рожевий плямисто-папульозний висип, без тенденції до злиття, з переважною локалізацією на спині, сідницях та розгинальних поверхнях верхніх кінцівок, системне збільшення лімфатичних вузлів?

- A.** Краснухи
- B.** Кору
- C.** Скарлатини
- D.** Вітряної віспи
- E.** Менінгококової інфекції

**70.** У пологовій залі породіллі запропонували провести перше раннє прикладання дитини до грудей. Це покращить скорочення матки та відшарування й народження посліду. Стимуляція синтезу якого гормону відбувається в цьому разі?

- A.** Окситоцину
- B.** Вазопресину
- C.** Адренкортикотропного
- D.** Соматотропіну
- E.** Хоріонічного гонадотропіну

**71.** Вкажіть місце перебування породіллі упродовж найближчих двох годин після фізіологічних пологів.

- A.** У пологовій залі
- B.** У післяпологовому відділенні
- C.** У гінекологічному відділенні
- D.** У відділенні патології вагітних
- E.** У відділенні екстрагенітальної патології

**72.** Як називається графічне відображення результатів динамічного спостереження під час пологів за процесом розкриття шийки матки та просування голівки плода, пологовою діяльністю, станом матері та плода?

- A.** Партограма
- B.** Міограма
- C.** Токограма
- D.** Кардіограма
- E.** Спірограма

**73.** У вагітної жінки віком 42 роки під час вимірювання зовнішніх розмірів та за з'ясувалося, що зовнішня кон'югата становить 15 см. Яка тактика ведення пологів у цьому разі?

- A.** Кесарів розтин
- B.** Накладання акушерських щипців
- C.** Вакуум-екстракція плода
- D.** Стимуляція пологів
- E.** Витягання плода за тазовий кінець

**74.** Який симптом найхарактерніший для хронічного гастриту з підвищеною секреторною функцією шлунку?

- A.** Печія
- B.** Дисфагія
- C.** Діарея
- D.** Гикавка
- E.** Метеоризм

**75.** У пацієнта діагностовано цукровий діабет 2-го типу легкого ступеня тяжкості (рівень глікемії — 8 ммоль/л, глюкозурія — до 20 г/добу). Вкажіть ключовий захід для підтримки стану компенсації вуглеводного обміну в пацієнта в цьому разі.

- A. Дієтотерапія
- B. Вітамінотерапія
- C. Повноцінний сон
- D. Прогулянки
- E. Загартовування

76. Пацієнт, який проживає в гірській місцевості, скаржиться на відчуття стиснення в ділянці ший, розлади ковтання, сухий кашель, утруднене дихання. Об'єктивно спостерігається: рівномірне дифузне збільшення щитоподібної залози без локальних ущільнень. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- A. Ендемічного зоба
- B. Дифузного токсичного зоба
- C. Аутоімунного тиреоїдиту
- D. Гіпотиреозу
- E. Підгострого тиреоїдиту

77. Пацієнтка скаржиться на зміну гостроти зору, двоїння в очах, погіршення сну, пітливість, дратівливість, зменшення маси тіла за збереженого апетиту. Об'єктивно спостерігається: тремор рук і тіла, пульс — 110 уд./хв, екзофтальм, збільшення розмірів щитоподібної залози. Попередній діагноз: дифузний токсичний зоб. Який із нижченаведених факторів посідає перше місце серед можливих причин розвитку цього захворювання?

- A. Психотравма
- B. Порушення дієти
- C. Шкідливі звички
- D. Переохолодження
- E. Куріння

78. Пацієнту з гострим коронарним синдромом призначено нітрогліцерин сублінгвально у дозі 0,5 мг. Який показник систолічного артеріального тиску в пацієнта є протипоказанням для його застосування?

- A. <90 мм рт. ст.
- B. <140 мм рт. ст.
- C. <150 мм рт. ст.
- D. <120 мм рт. ст.
- E. <180 мм рт. ст.

79. У пацієнта на тлі перебігу гострого інфаркту міокарда раптово погіршився загальний стан, посилився біль у серці, виникла різка слабкість. Об'єктивно спостерігається: свідомість сплутана, акроціаноз, холодний липкий піт, АТ — 70/30 мм рт. ст., пульс — 110 уд./хв, слабого наповнення. Яке ускладнення розвинулося в пацієнта?

- A. Кардіогенний шок
- B. Серцева астма
- C. набряк легень
- D. Тромбоемболія легеневої артерії
- E. Нестабільна стенокардія

80. Який лікарський засіб, що пригнічує агрегацію тромбоцитів, застосовується на догоспітальному етапі під час надання невідкладної допомоги пацієнту з інфарктом міокарда?

- A. Ацетилсаліцилова кислота
- B. Гепарин
- C. Нітрогліцерин
- D. Ніфедипін
- E. Бісопрол

81. Вкажіть прилад, який дозволяє виміряти пікову швидкість форсованого видиху та використовується для діагностики та оцінки ефективності лікування хронічних обструктивних захворювань легень (bronхіальної астми, хронічного обструктивного бронхіту тощо).

- A. Пікфлоуметр
- B. Глюкометр
- C. Пульсоксиметр
- D. Тонometr
- E. Радіометр

82. У пацієнта затяжний напад бронхіальної астми завершився розвитком астматичного статусу. Який показник є ключовим для призначення оксигенотерапії?

- A. Рівень сатурації
- B. Частота дихальних рухів
- C. Температура тіла
- D. Вік пацієнта понад 50 років
- E. Тривалість хвороби

83. У пульмонологічному відділенні лікується пацієнт із діагнозом: бронхоектатична хвороба. Яку процедуру необхідно застосувати для покращення відходження слизу та мокротиння з дихальних шляхів?

- A. Постуральний дренаж
- B. Кріотерапія
- C. Фонофорез
- D. Парафінові аплікації
- E. Зігрівальні компреси

84. Яка група лікарських препаратів використовується для етіотропного лікування госпітальної (нозокаміальної) пневмонії, спричиненої аеробними грамнегативними паличками?

- A. Антибіотики
- B. Відхаркувальні
- C. Жарознижувальні
- D. Седативні
- E. Бронхолітики

85. Який біологічний матеріал використовується для первинного діагностичного тесту на виявлення легеневого туберкульозу та визначення стійкості до рифампіцину у разі неможливості забору мокротиння?

- A. Кал
- B. Сеча
- C. Ексудат
- D. Кров
- E. Слина

86. Який із нижченаведених чинників сприяє розвитку хронічного бронхіту?

- A. Активне і пасивне куріння
- B. Надлишкова маса тіла
- C. Малорухливий спосіб життя
- D. Недотримання режиму харчування
- E. Зловживання алкоголем

87. У гастроентерологічному відділенні лікується пацієнт із діагнозом: виразкова хвороба шлунку. Які лікарські засоби пригнічують секрецію шлункового соку?

- A. Інгібітори протонної помпи
- B. Антигістамінні
- C. Антибактеріальні
- D. Антацидні
- E. Нестероїдні протизапальні

88. У пацієнта, який хворіє на виразкову хворобу шлунку, з'явилися скарги на швидку втомлюваність, втрату апетиту, відразу до м'ясної їжі, посилене слиновиділення, порушення ковтання. Для якого ускладнення характерні ці симптоми?

- A. Малігнізація
- B. Перфорація
- C. Пенетрація
- D. Пілоростенозу
- E. Шлункової кровотечі

89. Пацієнт із діагнозом: хронічний панкреатит, отримує протирецидивне лікування. Яке дослідження доцільно провести для визначення зовнішньосекреторної функції підшлункової залози?

- A. Дослідження калу на вміст еластази-1
- B. Дослідження шлункового соку
- C. Загальний аналіз крові
- D. УЗД органів черевної порожнини
- E. Холецистографію

90. Який лікарський засіб використовується для замісної терапії у разі недостатності зовнішньосекреторної функції підшлункової залози?

- A. Панкреатин
- B. Метоклопрамід
- C. Папаверин
- D. Платифілін
- E. Активоване вугілля

91. Пацієнт скаржиться на втрату апетиту, гіркий присмак у роті, біль і відчуття тяжкості у правому підребер'ї, жовтяничність шкіри і склер, свербіж шкіри, біль у суглобах. За результатами біохімічного дослідження крові виявлено високий рівень прямого білірубіну, виражена активність аланінамінотрансферази. Для якого захворювання характерні вказані клініко-лабораторні показники?

- A. Хронічного гепатиту
- B. Хронічного панкреатиту
- C. Гострого гастриту
- D. Хвороби Крона
- E. Виразкової хвороби шлунку

92. Який із нижченаведених чинників сприяє розвитку виразкової хвороби?

- A. Стрес
- B. Переохолодження
- C. Ожиріння
- D. Молодий вік
- E. Алергени

93. Пацієнту встановлено діагноз: гострий пієлонефрит. Чим зумовлений біль у поперековій ділянці у разі цього захворювання?

- A. Розтягненням ниркової капсули
- B. Корінцевим синдромом
- C. Уремією
- D. Підвищенням артеріального тиску
- E. Дизуричними розладами

94. У пацієнта з хронічною нирковою недостатністю швидкість клубочкової фільтрації становить 14 мл/хв. До якої лікувальної процедури необхідно підготувати пацієнта в цьому разі?

- A. Гемодіалізу
- B. Шунтування
- C. Літотрипсії
- D. Лапароцентезу
- E. Фонофорезу

95. Яке захворювання нирок характеризується наявністю таких клінічних проявів: артеріальна гіпертензія, олігурія та набряки?

- A.** Гострий гломерулонефрит
- B.** Сечокам'яна хвороба
- C.** Гостра ниркова недостатність
- D.** Хронічний пієлонефрит
- E.** Хронічна ниркова недостатність

**96.** У пацієнта віком 42 роки встановлено діагноз: сечокам'яна хвороба. Які продукти харчування рекомендується вживати пацієнту в разі фосфатурії?

- A.** М'ясні страви
- B.** Незбиране молоко
- C.** Прянощі
- D.** Лужні мінеральні води
- E.** Гострі страви

**97.** Пацієнтка скаржиться на ранкову скутість, деформацію і постійний біль у дрібних суглобах, зниження фізичної активності. Об'єктивно спостерігається: симетричні згинальні контрактури дрібних суглобів. На рентгенограмі кисті й зап'ястка — ерозії та виражений остеопороз безпосередньо прилеглих до суглоба кісток, анкілоз. Для якого захворювання це характерно?

- A.** Ревматоїдного артрит
- B.** Ревматичного поліартриту
- C.** Деформуючого остеоартрозу
- D.** Системного червоного вовчака
- E.** Системного васкуліту

**98.** Реабілітаційна програма для збереження функції уражених суглобів у пацієнтів із ревматоїдним артритом зазвичай включає різні методи лікування. Вкажіть метод, який спрямований на поліпшення рухливості та функції суглобів.

- A.** Механотерапія
- B.** Міостимуляція
- C.** Вісцеральна терапія
- D.** Пневмопресинг
- E.** Вакуумний масаж

**99.** У пацієнтки діагностовано системний червоний вовчак. Вкажіть ключовий метод профілактики загострень цієї хвороби.

- A.** Фотопротекція (обмеження перебування на сонці)
- B.** Загартовування (водні процедури)
- C.** Вживання у їжу йодовмісних продуктів (риба, йодована сіль)
- D.** Обмеження фізичної активності
- E.** Запобігання стресу

**100.** У тяжкохворого лежачого пацієнта на шкірі п'яток та ліктів виявлено зону стійкої гіперемії, цілісність шкіри не порушена. Вкажіть стадію розвитку про-

лежня.

- A.** I
- B.** II
- C.** III
- D.** IV
- E.** —

**101.** Тяжкохворий пацієнт хоспісу перебуває на ліжковому режимі. З якою метою застосовується шкала Braden під час догляду за пацієнтом?

- A.** Оцінювання ступеня виникнення ризику пролежнів
- B.** Розрахунку індексу маси тіла
- C.** Оцінки психоемоційного стану
- D.** Корекції психоемоційного стану
- E.** Планування реабілітаційних заходів

**102.** Яке дослідження проводиться для виявлення прихованої коронарної недостатності та ранньої діагностики стенокардії?

- A.** Велоергометрія
- B.** Енцефалографія
- C.** Спірографія
- D.** Аудиометрія
- E.** Нейроміографія

**103.** Пацієнту проведено прищільну біопсію з метою діагностики онкологічного захворювання. Яке лабораторне дослідження біоптату треба використати для виявлення злоякісних клітин чи інших змін, що можуть вказувати на наявність пухлинного процесу?

- A.** Цитологічне
- B.** Бактеріологічне
- C.** Біохімічне
- D.** Серологічне
- E.** Загальноклінічне

**104.** Вкажіть ключову умову для попередження пневмотораксу під час дренирування плевральної порожнини.

- A.** Забезпечення герметичності системи
- B.** Дотримання правил асептики
- C.** Перебування пацієнта під час процедури у позі «вершника»
- D.** Проведення місцевої анестезії
- E.** Проведення загальної анестезії

**105.** Нормальні пологи — це одноплідні пологи з мимовільним початком і прогресуванням пологової діяльності у потиличному передлежанні плода, що перебігають без ускладнень протягом усіх періодів пологів, за задовільного стану породіллі та новонародженого. У якому терміні вагітності відбуваються нормальні пологи?

- A. 37–42 тиж.
- B. 27–32 тиж.
- C. 32–35 тиж.
- D. 35–37 тиж.
- E. 42–45 тиж.

106. Пацієнту, який лікується в урологічному відділенні, призначено дослідження сечі за методом Зимницького. Яке співвідношення денного діурезу до нічного в нормі?

- A. 3:1
- B. 1:3
- C. 1:1
- D. 1:4
- E. —

107. Дієтотерапія — це метод лікування за допомогою раціонального харчування. Що означає принцип заміщення в дієтотерапії?

- A. Уведення в раціон харчування продуктів, у компонентах яких організм має дефіцит
- B. Збалансування харчування щодо білків, жирів, вуглеводів
- C. Виключення з раціону харчування їжі, багатой на клітковину
- D. Уникання можливості вживання продуктів, забруднених мікробами
- E. Вживання продуктів харчування з тривалим терміном придатності

108. В якому періоді менструального циклу найчастіше виникає апоплексія яєчника?

- A. У період овуляції
- B. У період менструації
- C. У фолікуліновій фазі
- D. У лютеїновій фазі
- E. У період регресу жовтого тіла

109. У породіллі за тиждень після пологів підвищилася температура тіла до 39,0°C, з'явилися біль унизу живота, озноб, нудота, головний біль. Під час гінекологічного дослідження виявлено гнійні виділення з цервікального каналу, потовщення, набряки та біль у ділянці придатків матки. Яке післяпологове захворювання розвинулося в жінки?

- A. Сальпінгоофорит
- B. Параметрит
- C. Ендометрит
- D. Пельвіоперитоніт
- E. Перитоніт

110. Епідемічний паротит — це інфекційне захворювання, що характеризу-

ється гарячкою, інтоксикацією та запаленням слинних залоз. Вкажіть збудника цього захворювання.

- A. *Mups virus* з родини *Coronaviridae*
- B. *Poliovirus* з родини *Picornaviridae*
- C. *Togaviridae*, роду *Rubivirus*
- D. *Rubeola virus*, роду *Morbilivirus*
- E. *Bordetella pertussis*
- F. ---- Збудник епідемічного паротиту є РНК-вмісним вірусом з роду *Rubulavirus*, родини *Paramyxoviridae*.

111. У пацієнта, який хворіє на пневмонію, на тлі швидкого (упродовж декількох годин) зниження температури тіла із 39,5°C до 37,0°C, раптово виникли загальна слабкість, запаморочення, відчуття холоду, серцебиття. Об'єктивно спостерігається: пацієнт млявий, апатичний, із зусиллям відповідає на запитання. Шкірні покриви та слизові бліді, холодний липкий піт, кінцівки холодні, дихання поверхневе, пульс — 98 уд./хв, слабого наповнення, АТ — 80/50 мм рт. ст. Який патологічний стан розвинувся в пацієнта?

- A. Колапс
- B. Кардіогенний шок
- C. Астматичний статус
- D. Набряк легень
- E. Анафілактичний шок

112. У пацієнтки віком 25 років за 2 тижні після перенесеного тонзиліту з'явилися різкий біль і припухлість колінних суглобів, згодом — гомілково-ступневих, підвищення температури до 38,0°C, серцебиття, задишка та рожеві еритематозні висипання на тулубі. Біль у суглобах має мігруючий характер, без стійкого порушення функції. У крові: лейкоцитоз, підвищення ШОЕ, С-реактивний білок — ++++. Для якого захворювання характерні вказані клініко-лабораторні показники?

- A. Гострої ревматичної гарячки
- B. Реактивного артрити
- C. Подагри
- D. Хвороби Рейтера
- E. Ревматоїдного артрити

113. Пацієнт віком 37 років скаржиться на кашель із виділенням великої кількості мокротиння з неприємним запахом, інколи «повним ротом», задишку, періодичне підвищення температури тіла та зниження працездатності. Об'єктивно спостерігається: мокротиння гнійно-слизового характеру, розшароване. Для якого захворювання характерні вказані клінічні прояви?

- A.** Бронхоектатичної хвороби
- B.** Негоспітальної пневмонії
- C.** Сухого плевриту
- D.** Гострого бронхіту
- E.** Екссудативного плевриту

**114.** У пацієнтки віком 55 років після емоційного перенавантаження з'явилися скарги на головний біль у потиличній ділянці, запаморочення, «миготіння мушок» перед очима, шум і дзвін у вухах, блювання. Об'єктивно спостерігається: пульс — 98 уд./хв, ритмічний, АТ — 190/100 мм рт. ст. Який патологічний стан розвинувся у пацієнтки?

- A.** Гіпертонічний криз
- B.** Тиреотоксичний криз
- C.** Кардіогенний шок
- D.** Анафілактичний шок
- E.** Колапс

**115.** У пацієнтки віком 60 років після фізичного навантаження виник стискаючий біль за грудниною з іррадіацією в ліву руку та ліве плече. Біль тривав близько 5-ти хвилин та минув після сублінгвального застосування нітрогліцерину. Об'єктивно спостерігається: блідість шкіри, пульс — 78 уд./хв, АТ — 130/80 мм рт. ст. Для якої патології характерні вказані клінічні прояви?

- A.** Стенокардії
- B.** Інфаркту міокарда
- C.** Міокардиту
- D.** Гострого перикардиту
- E.** Міжреберної невралгії

**116.** У пацієнта після парентерального введення антибіотика розвинувся анафілактичний шок. Яка ділянка тіла використовується для первинного внутрішньом'язового введення епінефрину під час надання невідкладної допомоги?

- A.** Зовнішня поверхня стегна
- B.** Внутрішня поверхня стегна
- C.** Зовнішня поверхня передпліччя
- D.** Внутрішня поверхня плеча
- E.** Внутрішня поверхня передпліччя

**117.** У чотирирічної дитини на шкірі тулуба виявлено висипання у вигляді поодиноких розеол, папул із ледь помітними пухирцями. Загальний стан дитини задовільний, температура тіла — 36,6°C. З анамнезу відомо, що дитина була в контакті з хворим на вітряну віспу, після чого їй було проведено пасивну специфічну профілактику. Яка форма вітряної віспи у дитини?

- A.** Рудиментарна
- B.** Типова
- C.** Бульозна
- D.** Вісцеральна
- E.** Пустульозна

**118.** П'ятирічна дитина захворіла гостро, спостерігається підвищення температури тіла до 39°C, сильний головний біль, повторне блювання. Під час об'єктивного обстеження виявлено: різка гіперестезія до всіх видів подразників, ригідність потиличних м'язів, позитивні симптоми Керніга та Брудзинського. Результати лабораторного дослідження спинномозкової рідини: ліквор каламутний, білого кольору, нейтрофільний плеоцитоз, збільшення кількості білка. У загальному аналізі крові: лейкоцитоз із нейтрофіліозом та зсувом лейкоцитарної формули вліво, лімфопенія, підвищення ШОЕ до 40 мм/год. Який збудник, найімовірніше, спричинив розвиток захворювання?

- A.** Менінгокок
- B.** Стрептокок
- C.** Стафілокок
- D.** Ротавірус
- E.** Мікобактерія туберкульозу

**119.** Вкажіть засіб, яким потрібно промити непошкоджену шкіру при потрапленні на неї крові або інших потенційно небезпечних біологічних рідин.

- A.** Водою з милом
- B.** Антисептиком
- C.** Фізіологічним розчином
- D.** Дезінфікуючим розчином
- E.** Етиловим спиртом

**120.** У пацієнтки віком 49 років після приймання вітамінного препарату виникли набряк губ та язика, охриплість голосу, «гавкаючий» кашель, відчуття нестачі повітря, утруднене шумне дихання. Об'єктивно спостерігається: пацієнтка збуджена, намагається глибоко вдихнути, шкіра ціанотична. Який патологічний стан розвинувся у пацієнтки?

- A.** Набряк Квінке
- B.** Поліноз
- C.** Анафілактичний шок
- D.** Кропив'янка
- E.** Набряк легенів

**121.** Пацієнта віком 25 років шпиталізовано бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги до лікарні у неприємному стані. З анамнезу відомо, що пацієнт хворіє на цукровий діабет 1-го типу та вводить інсулін. Об'єктивно спо-

стерігається: блідість і вологість шкірних покривів, підвищення м'язового тону, судоми, розширення зіниць, тону очних яблук не змінений. Рівень глюкози у крові — 2,2 ммоль/л. Який вид коми розвинувся в пацієнта?

- А. Гіпоглікемічна
- В. Уремічна
- С. Діабетична
- Д. Гіперосмолярна
- Е. Мозкова

122.

- А. Мієліту
- В. Пухлини спинного мозку
- С. Спінального інсульту
- Д. Поліомієліту
- Е. Розсіяного склерозу

123. У пацієнтки віком 67 років раптово розвинулися загальна слабкість, запаморочення, оніміння лівої верхньої кінцівки, погіршення мови та зору. Симптоми зберігаються понад 24 год. В анамнезі: ішемічна хвороба серця, перенесений інфаркт міокарда. Для якого порушення мозкового кровообігу характерні вказані клінічні прояви?

- А. Ішемічного інсульту
- В. Геморагічного інсульту
- С. Транзиторної ішемічної атаки
- Д. Дисциркуляторної енцефалопатії
- Е. —

124. У пацієнта розвинувся ангіоневротичний набряк. Препарати якої фармакологічної групи потрібно застосовувати для надання невідкладної допомоги в цьому разі?

- А. Антигістамінні
- В. Анальгетики
- С. Антихолінестеразні
- Д. Адреноміметики
- Е. Антибіотики

125. Для якого захворювання характерним є зниження секреторної та кислотоутворювальної функцій шлунку?

- А. Хронічного атрофічного гастриту
- В. Хронічного гіпертрофічного гастриту
- С. Виразкової хвороби шлунку
- Д. Хронічного панкреатиту
- Е. Цирозу печінки

126. Як називається спосіб комунікації, пов'язаний із використанням слів (мови) для передачі інформації?

- А. Вербальна
- В. Невербальна
- С. Офіційна
- Д. Дистанційна
- Е. Виховна

127. Яка шкала використовується для догоспітальної діагностики гострого порушення мозкового кровообігу?

- А. FAST
- В. ABCDE
- С. NRS
- Д. NIHSS
- Е. MMSE

128. До якої фармакологічної групи відноситься діазепам?

- А. Транквілізатори
- В. Антikonвульсанти
- С. Ноотропи
- Д. Міорелаксанти
- Е. Антидепресанти

129. У породіллі після народження посліду посилилася кровотеча. Об'єктивно спостерігається: матка м'яка, погано скорочується, під час огляду плаценти виявлено дефект часточки посліду. Яка акушерська маніпуляція застосовується в цьому разі?

- А. Ручна ревiзiя порожнини матки
- В. Огляд пологових шляхів
- С. Масаж матки на кулаці
- Д. Зовнішній масаж матки
- Е. Введення токолітичних препаратів

130. Чоловік скаржить на раптову появу висипу на шкірі та свербіж після вживання полуниці. Під час огляду на шкірі тулуба та кінцівок виявлено червоні плями, пухирі різних розмірів, подряпину, АТ — 120/80 мм рт. ст, пульс — 82 уд./хв. Який патологічний стан розвинувся у чоловіка?

- А. Кропив'янка
- В. Анафілактичний шок
- С. Короста
- Д. Набряк Квінке
- Е. Геморагічний васкуліт

131. Вкажіть тривалість приймання ро-

донової ванни.

- A. 10–15 хв
- B. 5–7 хв
- C. 1–2 хв
- D. 30–40 хв
- E. 50–60 хв

132. Який симптом (за автором) є часто позитивним у разі захворювань нирок?

- A. Пастернацького
- B. Щоткіна-Блюмберга
- C. Ортнера
- D. Кера
- E. Бабінського

133. Яке додаткове обстеження треба провести пацієнту для виявлення конкрементів у нирках?

- A. УЗД
- B. Бронхоскопію
- C. Іригоскопію
- D. Ректороманоскопію
- E. Холецистографію

134. Як називається патологічний стан, що розвивається як ускладнення бронхіальної астми та характеризується повною резистентністю до бронхолітичних засобів?

- A. Астматичний статус
- B. Легенева кровотеча
- C. Анафілактичний шок
- D. Кардіогенний шок
- E. набряк легень

135. Вкажіть місце накладання електроду із зеленим маркуванням під час проведення електрокардіографії.

- A. Ліва нога
- B. Права рука
- C. Права нога
- D. Ліва рука
- E. —

136. Які клінічні прояви найхарактерніші для гострого пієлонефриту?

- A. Гарячка, біль у поперековій ділянці
- B. Тахікардія, сеча кольору «м'ясних помий»
- C. Гіпертензія, набряки
- D. Анурія, свербіж шкіри
- E. —

137. Який метод дослідження сечі використовується для визначення концентраційної функції нирок?

- A. За Зимницьким
- B. За Нечипоренком
- C. За Аддіс-Каковським
- D. За Амбурже
- E. —

138. Як називається порушення діурезу, що характеризується зменшенням добової кількості сечі?

- A. Олігурія
- B. Поліурія
- C. Полакіурія
- D. Дизурія
- E. Ніктурія

139. Під час об'єктивного обстеження пацієнта сестра медична виявила, щона тлі сповільненого та рівномірного за глибиною дихання з'являються тривалі паузи (до 30 сек). Який тип дихання спостерігається у пацієнта?

- A. Дихання Біота
- B. Інспіраторна задишка
- C. Експіраторна задишка
- D. Дихання Куссмауля
- E. Дихання Чейна-Стокса

140. Які процедури треба порадити пацієнту після зняття гіпсової пов'язки для відновлення функції травмованої нижньої кінцівки?

- A. ЛФК, масаж
- B. Зігрівальний компрес
- C. Гірудотерапію
- D. УФО
- E. Фототерапію

141. Споживання продуктів зі збагаченим вмістом якого мікроелемента треба порекомендувати пацієнту, який хворіє на хронічну серцеву недостатність?

- A. Калію
- B. Кальцію
- C. Натрію
- D. Магнію
- E. Заліза

142. Пацієнт скаржиться на біль у надлобковій ділянці, бажання випорожнити сечовий міхур, сечовиділення відсутнє упродовж 12 годин. Для якого патологічного стану характерні вказані клінічні прояви?

- A. Гострої затримки сечі
- B. Травми нирки
- C. Ниркової коліки
- D. Розриву сечового міхура
- E. Гідроцеле

143. Вкажіть прояви дизуричного син-

дрому.

- A.** Часте болісне сечовипускання
- B.** Позитивний симптом Пастернацького
- C.** Піурія, протеїнурія
- D.** Альбумінурія, кетонурія
- E.** Гіпертензія, набряки

**144.** Який суб'єктивний симптом найхарактерніший для кропив'янки?

- A.** Свербіж шкіри
- B.** Іктеричність шкіри
- C.** Сльозотеча
- D.** Ціаноз шкіри
- E.** Мерзлякуватість

**145.** Вкажіть типовий симптом, характерний для хронічної серцевої недостатності.

- A.** Набряки на нижніх кінцівках
- B.** Набряки на обличчі
- C.** Підвищення температури тіла
- D.** Крововиливи на шкірі
- E.** Пітливість

**146.** Як називається метод ендоскопічного дослідження внутрішньої поверхні сечового міхура?

- A.** Цистоскопія
- B.** Бронхоскопія
- C.** Ректороманоскопія
- D.** Колоноскопія
- E.** Езофагогастродуоденоскопія

**147.** Вкажіть біологічно активну речовину, що міститься у секреті слинних залоз п'явки.

- A.** Гірудин
- B.** Гепарин
- C.** Гістамін
- D.** Лізоцим
- E.** Фібринолізин

**148.** Яка анатомічна ділянка тіла людини використовується для проведення щеплення БЦЖ?

- A.** Зовнішня поверхня верхньої третини лівого плеча
- B.** Підлопаткова ділянка
- C.** Верхній зовнішній квадрант сідниці
- D.** Середня третина внутрішньої поверхні передпліччя
- E.** Передня поверхня стегна

**149.** У якій лабораторії проводиться дослідження носоглоткових змивів на грип та ГРВІ?

- A.** Вірусологічній
- B.** Клінічній
- C.** Бактеріологічній
- D.** Імунологічній
- E.** Біохімічній

**150.** Як називається патологічний стан, що характеризується болем у суглобі та не супроводжується запальним процесом та/або порушенням рухливості в ньому?

- A.** Арталгія
- B.** Артрит
- C.** Артроз
- D.** Поліартрит
- E.** Полікістоз